

除草剤

名称: タッチダウンiQ
種類: グリホサートカリウム塩液剤

適用の範囲と使用方法

2016年11月17日現在

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
陸稲	—	一年生雑草	耕起前又はは種前 (雑草生育期: 草丈 30cm以下)	250~ 500mL/10a	25~100L /10a	2回以内	雑草茎葉散布	2回以内
水田作物 (水稲を除く)			耕起前 (雑草生育期: 草丈 30cm以下)					
移植水稲			は種14日前~出芽 前(雑草生育期) (乾田不耕起栽培)		50~100L /10a	1回		
直播水稲								
水田作物 (水田刈跡)	水田刈跡	多年生雑草	500~ 1000mL/10a	25~100L /10a	1回	雑草茎葉散布	1回	
		オモダカ						水田作物刈取後雑 草再生時(草丈 30cm以下)
		クログワイ キシウスズ メノヒエ						
水田作物 (水田畦畔)	水田畦畔	一年生雑草	250~ 500mL/10a	50~100L /10a	2回以内	雑草茎葉散布	3回以内	
		多年生雑草	500~ 1000mL/10a					
		スギナ	1500~ 2000mL/10a					
水田作物、畑作物 (休耕田)	休耕田	一年生雑草	250~ 500mL/10a	500~ 1000mL/10a	2回以内	雑草茎葉散布	3回以内	
		多年生雑草	500~ 1000mL/10a					

除草剤

名称: タッチダウンiQ
種類: グリホサートカリウム塩液剤

適用の範囲と使用方法

2016年11月17日現在

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
さとうきび	—	一年生雑草	耕起前又は植付前 (雑草生育期: 草丈 30cm以下)	250~ 500mL/10a	25~100L /10a	2回以内	雑草茎葉散 布	6回以内
			収穫60日前まで (雑草生育期: 畦間 処理)(但し、仮茎 長1.5m以上)	500mL/10a		1回		
	圃場内の周 縁部	多年生雑草	雑草生育期 但し、 収穫7日前まで	250~ 500mL/10a	25~50L /10a	2回以内		
				500~ 1000mL/10a				
麦類 (大麦、小麦(秋 播)を除く)	—	一年生雑草	耕起又はは種前 (雑草生育期)	250~ 500mL/10a	25~100L /10a	3回以内	雑草茎葉散 布	3回以内
	圃場内の周 縁部		雑草生育期 但し、 収穫7日前まで (草丈30cm以下)		25~50L /10a			
—			耕起又はは種前 (雑草生育期)		25~100L /10a			
	は種後出芽前 (雑草生育期: 草丈 30cm以下)							
大麦	圃場内の周 縁部	雑草生育期 但し、 収穫7日前まで (草丈30cm以下)	25~50L /10a	3回以内				

除草剤

名称: タッチダウンiQ
種類: グリホサートカリウム塩液剤

適用の範囲と使用方法

2016年11月17日現在

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
小麦(秋播)	—	一年生雑草	耕起又はは種前 (雑草生育期)	250~ 500mL/10a	25~100L /10a	1回		3回以内
			は種後出芽前 (雑草生育期: 草丈 30cm以下)					
		多年生イネ 科雑草	耕起3日以前 (雑草生育期)	500~ 1000mL/10a				
	圃場内の周 縁部	一年生雑草	雑草生育期 但し、 収穫3日前まで (草丈30cm以下)		25~50L /10a			
			耕起又はは種7日 以前(雑草生育期: 草丈30cm以下)	250~ 500mL/10a				
雑穀類 (そばを除く)	—	一年生及び 多年生雑草 (スギナを除 く)	耕起又はは種前 (雑草生育期: 草丈 30cm以下)	500~ 1000mL/10a	25~100L /10a		雑草茎葉散 布	2回以内
そば			収穫5日前まで (雑草生育期: 草丈 30cm以下)					
果樹類 (かんきつを除く)		一年生雑草	収穫5日前まで (雑草生育期)	1500~ 2000mL/10a	25~50L /10a	3回以内		
		多年生雑草	一年生雑草	250~ 500mL/10a	10~100L /10a			
かんきつ	多年生雑草	収穫5日前まで (雑草生育期: 草丈 30cm以下)	500~ 1000mL/10a	25~50L /10a		3回以内		5回以内
	スギナ	収穫5日前まで (雑草生育期)	1500~ 2000mL/10a					
	スギナ	収穫5日前まで (雑草生育期)	1500~ 2000mL/10a					

除草剤

名称: タッチダウンiQ
種類: グリホサートカリウム塩液剤

適用の範囲と使用方法

2016年11月17日現在

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
野菜類 (えだまめ、たらのき、はくさい、キャベツ、レタス、ねぎ、たまねぎ、ほうれんそう、にんじん、だいこん、はつかだいこん、アスパラガス、トマト、きゅうり、なす、オリーブ(葉)、しゃくやく(葉用)、とうがらし類、ピーマン、びわ(葉)、薬用にんじんを除く)	—	一年生雑草	耕起7日以前 (雑草生育期: 草丈30cm以下)	250~500mL/10a	25~50L/10a	1回	雑草茎葉散布	1回
レタス			耕起又は定植7日以前 (雑草生育期: 草丈30cm以下)			2回以内		
ねぎ			畦間処理・雑草生育期 (草丈30cm以下) 但し、収穫7日前まで			3回以内		
キャベツ はくさい			耕起又は定植7日以前(雑草生育期: 草丈30cm以下)			1回		1回
にんじん			耕起又はは種7日以前 (雑草生育期: 草丈30cm以下)			2回以内		2回以内
ほうれんそう						3回以内		
だいこん						2回以内		
はつかだいこん						1回		

除草剤

名称: タッチダウンiQ
種類: グリホサートカリウム塩液剤

適用の範囲と使用方法

2016年11月17日現在

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数	
				薬量	希釈水量				
えだまめ たらのき	—	一年生雑草	耕起7日以前 (雑草生育期:草丈 30cm以下)	250~ 500mL/10a	25~50L /10a	1回	雑草茎葉散 布	3回以内	
たまねぎ			畦間処理:雑草生 育期 (草丈30cm以下) 但し、収穫7日前ま で			3回以内			
			トマト きゅうり なす			耕起7日以前 (雑草生育期:草丈 30cm以下)			1回
アスパラガス						畦間処理:雑草生 育期(草丈30cm以 下)但し、収穫前日 まで			25~100L /10a
			一年生広葉 雑草			耕起7日以前 (雑草生育期:草丈 30cm以下)			25~50L /10a
		萌芽前又は収穫打 切り後 (雑草生育期:草丈 30cm以下)		500~ 1000mL/10a	25~100L /10a				
スギナ		1000mL/10a	1500~ 2000mL/10a	25~50L /10a					
		畦間処理:雑草生 育期 但し、収穫前 日まで							
豆類 (種実、ただし、だ いず、らっかせい を除く)		一年生雑草	耕起7日以前 (雑草生育期:草丈 30cm以下)	250~ 500mL/10a	25~50L /10a	1回			2回以内
			畦間処理:雑草生 育期 但し、収穫3日前ま で						

除草剤

名称: タッチダウンiQ
種類: グリホサートカリウム塩液剤

適用の範囲と使用方法

2016年11月17日現在

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
だいず	—	一年生雑草	耕起又はは種7日以前 (雑草生育期:草丈30cm以下)	250~500mL/10a	25~100L/10a	2回以内	雑草茎葉散布	4回以内
		コウキヤガラ						
		は種後出芽前 (雑草生育期:草丈30cm以下)						
いも類(ばれいしょ、かんしょを除く)	—	一年生雑草	耕起7日以前 (雑草生育期:草丈30cm以下)	25~50L/10a	25~50L/10a	1回	雑草茎葉散布	1回
かんしょ	—	一年生雑草	耕起7日以前 (雑草生育期:草丈30cm以下)	25~100L/10a	25~100L/10a	2回以内	雑草茎葉散布	2回以内
ばれいしょ	—	一年生雑草	耕起又は植付前 (雑草生育期:草丈30cm以下)	25~50L/10a	25~50L/10a	1回	雑草茎葉散布	1回
			植付後萌芽前 (雑草生育期:草丈30cm以下)					
とうがらし類 ピーマン	—	一年生雑草	耕起7日以前 (雑草生育期:草丈30cm以下)	25~50L/10a	25~50L/10a	2回以内	雑草茎葉散布	2回以内
オリーブ(葉) びわ(葉)	—	一年生雑草	耕起7日以前 (雑草生育期:草丈30cm以下)	25~50L/10a	25~50L/10a	3回以内	雑草茎葉散布	3回以内
薬用ニンジン	—	一年生雑草	耕起7日以前 (雑草生育期:草丈30cm以下)	25~50L/10a	25~50L/10a	10回以内 (1年間に2回以内)	雑草茎葉散布	10回以内 (1年間に2回以内)

除草剤

名称: タッチダウンiQ
種類: グリホサートカリウム塩液剤

適用の範囲と使用方法

2016年11月17日現在

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数		
				薬量	希釈水量					
しゃくやく(薬用)	—	一年生雑草	畦間処理: 雑草生育期 但し、収穫7日前まで	250~500mL/10a	25~100L/10a	3回以内	—	3回以内		
茶		一年生及び多年生雑草	摘採7日前まで (雑草生育期(春~夏期): 草丈30cm以下)		25~50L/10a					
飼料用とうもろこし		一年生雑草	は種後出芽前 雑草生育期 (草丈30cm以下)	200~500mL/10a	25~100L/10a			2回以内	雑草茎葉散布	2回以内
ソルガム			耕起又はは種前 (雑草生育期: 草丈30cm以下)	250~500mL/10a	25~50L/10a					
牧草	牧野・草地 (更新)	多年生雑草	耕起10日以前 (雑草生育期)	300~500mL/10a	25~100L/10a	2回以内	雑草茎葉散布			3回以内
			一年生及び多年生雑草	は種10日前~は種当日 (耕起整地後: 雑草発生揃期)						
		リードカナリーグラス	最終刈取後 (雑草生育期: 草丈50cm以下)	500~1000mL/10a				50L/10a		
桑	—	一年生及び多年生雑草	雑草生育期 (草丈30cm以下)	250~500mL/10a	25~50L/10a	4回以内	—	4回以内		
樹木類		一年生雑草	—	—	—					

除草剤

名称: タッチダウンiQ
種類: グリホサートカリウム塩液剤

適用の範囲と使用方法

2016年11月17日現在

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
林木	造林地 (地ごしらえ)	ススキ、ササ類、クズ等の多年生雑草	生育盛期以降 (夏~秋期)	1000~ 1500mL/10a	30L/10a		雑草木茎葉 散布	
		落葉雑かん木						
樹木等	公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、鉄道、運動場、宅地、のり面等	一年生雑草	雑草生育期 (草丈50cm以下)	250~ 500mL/10a	10~100L /10a	3回以内	植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布	3回以内
		多年生雑草		500~ 1000mL/10a				
		スギナ	雑草生育期	1500~ 2000mL/10a	25~100L /10a			
		ヒレハリソウ	雑草生育期 (草丈50cm程度)	1000~ 2000mL/10a	50~100L /10a			
		ススキ	雑草生育期 (草丈100cm程度)					
		クズ						
		ササ類	雑草生育期 (草丈50cm以下)					
		マツヨイグサ類	雑草生育期 (夏~秋期 草丈50cm以下)					
雑かん木	雑草生育期 (150cm)以下	25~100L /10a						